

Jueves, 15 de enero de 2004



Hospital Obispo Polanco, uno de los dos que prestan servicio en la provincia de Teruel

Teruel registra menos mortandad por tumores que Aragón y España

Las cifras revelan un notable índice de supervivencia

M.J.E./Teruel
La provincia de Teruel registra un índice de muertes a consecuencia de tumores muy inferior al regional y al nacional, según se pone de manifiesto en la encuesta de defunciones según la causa de muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reciente ha dado a conocer los datos del 2001. Este hecho no es una sorpresa, ya el año anterior se publicó un estudio sobre algunos tipos de cáncer que demostró que en el "Obispo Polanco" el índice de supervivencia era similar, cuando no superior, al de hospitales de Estados Unidos.

Como en el conjunto de Aragón y de España, la principal fuente de defunciones son la enfermedades del sistema circulatorio, siguen los tumores y a continuación las dolencias respiratorias; estos tres grupos acaparan casi el 70% de los óbitos. Dentro de los 112 conceptos o causas de la muerte que contempla el INE, el que mayor desviación presenta en Teruel frente al conjunto de España es

el de tumores, que causan el 24,39% de las muertes en la provincia en lugar de 27,13% de media nacional - una diferencia de 2,75 puntos-; en el extremo contrario, los óbitos en Teruel a causa de enfermedades cardiovasculares suman el 11,64%, y en España el 10,15%, es decir, 1,49 puntos menos.

No menos, sino más casos

José María del Val, jefe del Servicio de Cirugía del hospital Obispo Polanco de la capital, manifestó que, en efecto, parece que en Teruel la mortalidad por cáncer es menor, y ya se vio así en un estudio que se hizo en el año 2000 a raíz de la contratación de un oncólogo que no tenían. Eso no quiere decir que se den menos casos de tumores en la población, ya que más bien ocurre al contrario.

Ese estudio se limitaba a los tumores que precisaban tratamiento de quimioterapia, los de mama y colonrectales. "Veíamos que había pocos efectos secundarios y que la gente respondía muy

bien al tratamiento", recuerda el responsable de cirugía. Los resultados del estudio fueron sorprendentes, "para nosotros fue un estímulo porque, sin tener oncólogo, estábamos al día".

Baja estancia

En la encuesta de morbilidad hospitalaria del INE, por otro lado, consta que la estancia media en los hospitales de la provincia fue de siete días, por debajo de la media, ocho; Teruel comparte esta cifra con varias provincias y sólo están por debajo, con seis días, Baleares, Albacete, Jaén, Valencia y Ceuta. Palencia es donde mayor fue la estancia media, 17 días.

La edad media de los pacientes osciló en 2001 entre 37 años en Melilla y 59 en Soria; en Teruel fue de 53: 55 los varones y 51 las mujeres.

Las estancias más breves, dos días, correspondieron a enfermedades del ojo y sus anexos y a abortos, y las más prolongadas, 17 de media, como consecuencia de trastornos mentales.

CAUSAS DE MUERTE EN TERUEL (2001)

1.- Enfermedades del sistema circulatorio (578 casos, 35,42%)

El grueso de los óbitos se debió a las enfermedades cerebrovasculares (190) e infarto agudo de miocardio (111), en ambos casos con porcentajes inferiores a la media regional y nacional. Al contrario de lo que ocurre con insuficiencias cardíacas (80) y otras enfermedades del corazón (70).

2.- Tumores (398 fallecimientos, 24,39%)

El porcentaje de tumores como causa de la muerte es en Teruel sensiblemente inferior al de Aragón y de España. Destacaron por importancia los del aparato respiratorio (traquea, bronquios y pulmón) y los de colon (53 y 44 fallecimientos respectivamente), también los más frecuentes en Aragón y España. En tercer lugar, los de próstata (33) y estómago (29), con una proporción ligeramente inferior a la aragonesa y española.

3.- Enfermedades del sistema respiratorio (188 muertes, 11,52%)

Son, porcentualmente, más letales que en los otros territorios. Las crónicas excepto asma (67) y las catalogadas como otras enfermedades del sistema respiratorio (60) se llevan la palma.

4.- Enfermedades del sistema digestivo (88 óbitos, 5,39%)

La mayoría de las muertes se deben a las englobadas en "otras" (53) y sigue la cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (19)

5.- Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio (67 muertes, 4,11%)

Tienen más importancia como motivo del óbito en Teruel que en Aragón y, sobre todo, que en España. En este concepto está el paro cardíaco (31), senilidad (26), otras (10) y muerte súbita infantil, de la que no se dio ningún caso.

6.- Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (61 fallecidos, 3,74%)

Se reparten entre Alzheimer (40) y otras (21). No hubo ningún caso de meningitis.

7.- Enfermedades del sistema genitourinario (58 muertes, 3,55%)

Bastante más frecuentes que en la región y el estado, la mayoría de los óbitos fueron por enfermedades del riñón y el uréter (51)

8.- Causas externas de mortalidad (52 casos, 3,19%)

Ocurre al contrario, en Teruel es motivo de muerte en una proporción sensiblemente inferior a la del conjunto de Aragón y de España. Accidentes de tráfico (17) y suicidios (11) arrojan las cifras peores. Siguen en importancia caídas accidentales (7), otros accidentes (6), ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales (3). No hubo ningún óbito por homicidio o envenenamiento accidental.

9.- Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (43 muertes, 2,63%)

Otro concepto en el que la letalidad está por debajo de los otros territorios. La mayoría de los fallecimientos, 33, fueron por diabetes mellitus.

10.- Trastornos mentales y del comportamiento (34 casos, 2,08)

También en este caso los porcentajes de Teruel son bastante inferiores al regional y nacional. Los trastornos mentales orgánicos, senil y presenil, acaparan 31 de las muertes.

Otras:

En el resto de los conceptos, menos importantes, destaca la ausencia de óbitos por motivos como Sida, tuberculosis y enfermedades de la piel. A causa del embarazo, parto y puerperio tampoco se dieron fallecimientos en Aragón y sólo 17 en España.

PRINCIPALES MOTIVOS DE MUERTE EN TERUEL, ARAGON Y ESPAÑA (AÑO 2001)

| CAUSA | Porcentaje (%) | | | CAUSA | Porcentaje (%) | | |
|--|----------------|--------|--------|---|----------------|--------|--------|
| | Teruel | Aragón | España | | Teruel | Aragón | España |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 35,42 | 33,87 | 34,54 | Trastornos mentales y del comportamiento | 2,08 | 3,32 | 3,15 |
| Tumores | 24,39 | 27,15 | 27,13 | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 1,84 | 1,48 | 0,93 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 11,52 | 9,99 | 10,37 | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1,35 | 1,30 | 1,82 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 5,39 | 5,15 | 5,11 | Enfermedades de la sangre, de órganos hematopoyéticos y mecanis. de inmunidad | 0,43 | 0,34 | 0,28 |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 4,11 | 3,75 | 2,74 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0,25 | 0,16 | 0,27 |
| Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 3,74 | 3,67 | 3,24 | Afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,12 | 0,20 | 0,25 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 3,55 | 2,66 | 2,30 | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 0,00 | 0,24 | 0,27 |
| Causas externas de mortalidad | 3,19 | 3,85 | 4,44 | Embarazo, parto y puerperio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 2,63 | 2,83 | 3,15 | | | | |